



Complicaciones del embarazo o durante éste

Enfermedad	Síntomas	Razones por las cuales puede ser peligrosa	Tratamiento
<p>Embarazo ectópico</p> <p>Embarazo ectópico. Esto es cuando el óvulo fertilizado no hace todo el recorrido a través del útero. En lugar de esto, comienza a crecer en una de las trompas de Falopio (algunas veces llamado un "embarazo tubárico") o en otra parte del cuerpo.¹</p>	<p>Algunos síntomas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sangrado de la vagina; algunas veces llamado "canal de nacimiento";¹ • calambres;¹ • dolor en el abdomen o la pelvis (área de la parte inferior del tronco).² 	<p>El bebé en crecimiento puede causar daño a la parte del cuerpo en la que está creciendo. Cuando sucede esto hay riesgo de sangrado e incluso de muerte para la mujer.¹</p>	<p>El bebé no puede sobrevivir.¹ Un embarazo ectópico se debe terminar lo antes posible para salvar la vida de la mujer.¹</p>
<p>Insuficiencia cervicouterina</p> <p>Esto sucede cuando el cuello uterino (la abertura del útero) es débil y comienza a abrirse demasiado pronto.³</p>	<p>Una sensación pesada en la pelvis (área inferior del tronco) o secreción vaginal abundante.</p>	<p>Puede provocar un aborto espontáneo o un bebé que nace con demasiada anticipación.⁴</p>	<p>Se puede tratar con reposo en cama o un tratamiento llamado "cerclaje". Esto es cuando el cuello uterino se cose para cerrarlo.³</p>
<p>Diabetes gestacional</p> <p>Esto es cuando una mujer embarazada tiene niveles altos de glucosa en la sangre.</p>	<p>A menudo no hay síntomas. Esto puede hacer que la mujer sienta mucha sed u orine con mayor frecuencia.⁵</p>	<p>Si no se trata puede aumentar el riesgo de problemas de salud para la mujer y el bebé.¹</p>	<p>A menudo se les enseña a las mujeres a medir en casa su nivel de azúcar en la sangre. La recomendación del médico puede incluir:¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • una dieta saludable que limite la cantidad de azúcar; • evitar subir mucho de peso durante el embarazo; • tomar medicamentos si el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto; • controlar el nivel de glucosa.



Complicaciones del embarazo o durante éste

Enfermedad	Síntomas	Razones por las cuales puede ser peligrosa	Tratamiento
<p>Preeclampsia</p> <p>Esto es cuando una mujer tiene presión arterial alta y niveles elevados de proteína en la orina.¹</p>	<p>Algunos de los síntomas son presión arterial alta e hinchazón en las manos y los pies.⁶</p>	<p>Puede provocar desprendimiento de la placenta (consulte a continuación). Los bebés tienen más probabilidades de tener problemas después del nacimiento. Los bebés pueden nacer pequeños.¹</p>	<p>Las mujeres pueden necesitar reposo en cama o ser hospitalizadas. Es posible que deban tomar medicamento para disminuir la presión arterial baja.¹</p>
<p>Desprendimiento de placenta</p> <p>Esto es cuando la placenta se desprende de la pared del útero demasiado pronto.¹ La placenta es la fuente de oxígeno y alimentación para el bebé.</p>	<p>Algunos síntomas son:¹</p> <ul style="list-style-type: none"> dolor en el abdomen (área del vientre); un abdomen que está sensible cuando se presiona. 	<p>Puede causar sangrado y otros problemas graves a la mujer. No llega suficiente oxígeno y nutrientes al bebé.¹</p>	<p>Las mujeres con este problema son enviadas al hospital y puede que tengan que hacer reposo en cama. Algunas veces el bebé nace antes de tiempo.¹</p>
<p>Placenta previa</p> <p>Esto es cuando la placenta cubre total o parcialmente la abertura del útero (cuello uterino).¹</p>	<p>Sangrado indoloro de la vagina en los últimos meses del embarazo. La sangre puede ser de color rojo brillante.¹</p>	<p>La mujer puede perder gran cantidad de sangre. Esto es peligroso tanto para ella como para el bebé.¹</p>	<p>Las mujeres con sangrado abundante pueden ser enviadas al hospital hasta el momento del parto.¹</p>

Referencias

1. Merck Manual Home Edition [Manual Merck edición para el hogar]. Risk Factors That Develop During Pregnancy [Factores de riesgo que se desarrollan durante el embarazo (Solamente disponible en inglés)]. <http://www.merck.com/mmhe/sec22/ch258/ch258c.html>
2. MayoClinic.com. Ectopic Pregnancy [Embarazo ectópico (Solamente disponible en inglés)]. <http://www.mayoclinic.com/health/ectopic-pregnancy/DS00622>
3. Dartmouth-Hitchcock Medical Center. Incompetent Cervix [Insuficiencia cervicouterina (Solamente disponible en inglés)]. http://www.dhmc.org/webpage.cfm?site_id=2&org_id=92&mor_g_id=08&sec_id=0&gsec_id=41930&item_id=41951
4. American Pregnancy Association [Asociación Estadounidense de Embarazo]. Incompetent Cervix: Weakened Cervix [Insuficiencia cervicouterina: Debilidad del cuello uterino (Solamente disponible en inglés)]. <http://www.americanpregnancy.org/pregnancycomplications/incompetentcervix.html>
5. MayoClinic.com. Gestational Diabetes [Diabetes gestacional (Solamente disponible en inglés)]. <http://www.mayoclinic.com/health/gestational-diabetes/DS00316>
6. familydoctor.org. Preeclampsia [Preeclampsia (Solamente disponible en inglés)]. <http://familydoctor.org/online/famdocen/home/women/pregnancy/complications/064.html>

Esta información no está destinada a sustituir la atención médica profesional. Siga siempre las instrucciones de su proveedor de atención médica. Proporcionada como un servicio educativo por Schering-Plough Managed Markets.

Derechos de autor © 2008, Schering Corporation, Kenilworth, NJ 07033. Todos los derechos reservados.

